

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



К.А. САВЕНКОВ

01 ИЮЛ 2025

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата МониГран (MoniGran)
(организация-разработчик: ООО «ВЕТФАРМСТАНДАРТ»,
125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24 Д, БЦ «Меридиан»)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-21.23-5035 №ПВР-3-21.23/03847

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: МониГран (MoniGran)
Международное непатентованное наименование: монензин.

2. Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

МониГран (MoniGran) в качестве действующего вещества в 1 г содержит 200 мг монензина (в форме натриевой соли), а также вспомогательное вещество: карбонат кальция.

3. По внешнему виду препарат представляет собой порошок серо - коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 3 года с даты производства.

Запрещается применение МониГран по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 10 кг и 25 кг в пластиковые мешки с полиэтиленовым вкладышем соответствующей вместимости и запечатанным пластиковыми стяжками. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре до 30 °С. Допускается кратковременное (до 30 суток) хранение и транспортирование МониГран при температуре не выше 40°С всеми видами транспортных средств, в закрытой упаковке производителя. Свойства при разморозке не теряются.

6. Хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается по рецепту ветеринарного врача или требованию ветеринарной организации.

II. Фармакологические свойства

9. МониГран (MoniGran) относится к антикокцидийным лекарственным препаратам. Это полиэфирный антибиотик, принадлежащий к группе ионофоров.

10. Моне́нзин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром кокцидиостатического действия, активен в отношении всех видов кокцидий, паразитирующих у кур, включая *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. mivati* и *E. maxima*, а также *E. adenoides*, *E. meleagrimitis* и *E. gallopavonis*, паразитирующих у индеек и против *E. bovis* и *E. Ziemii*, паразитирующих у крупного рогатого скота.

Действие монензина на кокцидии заметно в основном на первой фазе развития (шизогонии), в результате которого останавливается половое созревание.

При пероральном введении птице препарат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте. Выводится из организма птиц в основном в неизмененном виде с пометом.

У телят монензин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, активно метаболизируясь в печени. Выводится из организма в основном (до 35%) с желчью.

МониГран по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности (умеренно опасные вещества).

III. Порядок применения

11. МониГран применяют для профилактики кокцидиоза у крупного рогатого скота, цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур, индеек на откорме.

12. Запрещается применение МониГран курам-несушкам, ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки и индеек старше 16 недель.

Запрещается применение крупному рогатому скоту при повышенной чувствительности животного к монензину или карбонату кальция.

13. При проведении лечебных мероприятий с использованием препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами, использовать средства индивидуальной защиты: защитную маску или респиратор, защитные очки, перчатки. После применения препарата необходимо вымыть руки с мылом.

Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Пустая упаковка из-под препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть струей воды, при попадании внутрь - обратиться к врачу. При себе иметь инструкцию по применению или этикетку.

14. МониГран не применяют беременным животным.

15. МониГран применяют для профилактики кокцидиоза:

- цыплятам - бройлерам - 0,45-0,5 кг/т (90-100 г/т монензина) с первого дня жизни в течение периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя;
- ремонтному молодняку кур и индейкам - 0,3-0,45 кг/т (60-90 г/т монензина) с первого дня жизни до 16-недельного возраста;
- телятам применяют в дозе из расчета 125 мг монензина натрия на голову в день (но не более 180 мг монензина натрия на голову в день, в зависимости от степени поражения), в период откорма в возрасте от 3 недель до 1 года, в течение 3 месяцев;

– телятам и крупному рогатому скоту с массой тела более 250 кг – из расчета 250 мг монензина на голову в день в течение 3-4 недель.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу препарата тщательно смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем вносят при тщательном перемешивании в корм.

16. При передозировке препарата у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы. В этом случае необходимо прекратить введение препарата.

При передозировке препарата у телят может наблюдаться снижение аппетита, сонливость, цианоз слизистых оболочек. В этом случае необходимо прекратить введение препарата.

17. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

18. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению профилактической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

19. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

20. Запрещается применение препарата в течение 7 суток до и в течение 7 суток после применения тиамулина, а также с другими кокцидиостатиками. МониГран совместим с витаминными и кормовыми добавками для ветеринарного применения.

21. Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после окончания применения препарата. Убой КРС на мясо разрешается не ранее, чем через 4 суток после окончания применения препарата. Молоко от животных, получавших МониГран, может использоваться в пищевых целях через 1 сутки после последнего применения препарата.

Мясо убитых животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

1. «Zhejiang Dayang Biotech Group Co., LTD»,
22, Zhaoyang Road, Dayang Town, Jiande City,
Zhejiang Province, Китай
2. ООО «Лабфарма», Республика Беларусь,
220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.187, корп.8,
4 этаж, помещение 34

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ООО «ВЕТФАРМСТАНДАРТ», 125445,
г. Москва, ул. Смольная, д. 24Д, БЦ
«Меридиан»).

Генеральный директор
ООО «ВЕТФАРМСТАНДАРТ»



А.О. Темников