

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФИТАЗОН ЛФ»

1. Торговое наименование кормовой добавки: Фитазон ЛФ.

Назначение: для повышения усвояемости фосфора из растительных ингредиентов корма крупного рогатого скота, свиней и птицы посредством расщепления фитиновой кислоты.

2. Состав: термостабильная фитаза (штамм-производитель *Aspergillus niger*) с активностью не менее 10000 ЕД/г и наполнитель мука доломитовая - до 100%.

3. Форма выпуска кормовой добавки: порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета без затхлого и плесневого запаха. Допускается наличие вкраплений и легко разбивающихся комков.

4. Фасовка, упаковка, условия хранения, транспортировки, срок годности. Добавку фасуют в полимерные контейнеры по 0,1; 0,5; 1,0 кг, многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем массой 5,0; 10; 25 кг.

Условия хранения и транспортировки: в закрытой упаковке производителя, в сухом месте при температуре от 4 °С до 30 °С и относительной влажности не более 75 %. Допускается транспортирование при температуре ниже 0 °С. Следует хранить в месте, недоступном для детей.

Срок годности: 24 месяца с даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5. Основные биологические и другие свойства кормовой добавки. Входящая в состав добавки термостабильная фитаза гидролизует фитаты кормов (соли мио-инозитол-гексаксидигидрофосфорной кислоты) до миоинозитола и неорганического фосфата, повышает переваривание и усвоение питательных веществ при кормлении крупного рогатого скота, свиней и птиц, увеличивая показатели их продуктивности.

6. Показания к применению кормовой добавки. Добавку применяют для повышения доступности и усвояемости фосфора в рационах крупного рогатого скота, свиней и сельскохозяйственной птицы.

7. Порядок и способ применения кормовой добавки. Добавку применяют путем ввода в комбикорма, кормовые смеси и премиксы на предприятиях, изготавливающих премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки, комбикорма или в кормоцехах хозяйства, используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода групповым методом из расчета на тонну комбикорма:

Вид животных	Норма ввода
Сельскохозяйственная птица (цыплята-бройлеры, куры-несушки)	100 г на 1 тонну комбикорма
Свиньи	100 г на 1 тонну комбикорма
Крупный рогатый скот	100 г на 1 тонну комбикорма

Рекомендуется включать в рационы сельскохозяйственных животных и птицы любых половозрастных групп на протяжении всего периода выращивания и содержания.

8. Возможные побочные явления и осложнения, в том числе при передозировке. Меры предупреждения и лечения. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. При применении добавки у животных с повышенной индивидуальной чувствительностью возможны аллергические реакции (кожная сыпь, эритема, зуд), угнетение, отказ от корма. При наличии побочных явлений и осложнениях применение прекращают и назначают, при необходимости, антигистаминные препараты и симптоматические средства.

9. Совместимость с другими кормовыми добавками и ветеринарными препаратами: не исследовалась.

10. Противопоказания для применения кормовой добавки: противопоказанием к применению кормовой добавки является повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам.

11. Сроки возможного использования продуктов животного происхождения после применения кормовой добавки. Использование продукции животноводства во время и после применения добавки разрешается без ограничений.

12. Соблюдение предосторожности, правил личной гигиены, использование средств защиты при работе с кормовыми добавками. Оказание первой помощи пострадавшим и рекомендуемые антидоты (при необходимости). При работе с добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с кормовыми добавками. Рабочие и ветеринарные специалисты при использовании добавки должны пользоваться спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и соблюдать общие санитарно-гигиенические правила работы. Людям с гиперчувствительностью к компонентам добавки следует избегать прямого контакта с добавкой. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению добавки или этикетку). При случайном контакте добавки с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Специфического антидота нет, проводится симптоматическая терапия.

13. Производитель кормовой добавки: общество с ограниченной ответственностью «Лабфарма».

Юридический адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 187, корп. 8, 4 этаж, к. 34.

Адрес производственной площадки: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 187, корп. 8, 4 этаж. Телефон/факс: +375 (17) 373-54-11/+375 (17) 272-87-03. Электронная почта: labfarma8@gmail.com.

14. Организация, уполномоченная на принятие претензий: общество с ограниченной ответственностью «Лабфарма». Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса, 187, корп. 8, 4 этаж. Телеф

он/факс: +375 (17) 373-54-11/+375 (17) 272-87-03. Электронная почта: labfarma8@gmail.com.

15. Порядок предъявления рекламаций. В случае возникновения тяжелых осложнений, угрожающих жизни животных, после применения добавки, ее использование прекращают, потребитель сообщает производителю и обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению, хранению добавки в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

Регистрационный номер кормовой добавки: AD-43AD-D4D626