

Предупреждение роста рогов у телят

1. Выделение телят для декорнуации	
2. Выбор способа проведения предупреждения роста рогов у телят	
3. Провести обездвиживание телят	
Химический способ (предпочтительный) 5–10-й день после рождения	Термический способ (резервный) на 30 день
<ul style="list-style-type: none"> a. Использовать пасту для обезроживания Dr. Быков. b. Кожу вокруг роговых бугорков на расстоянии 20 мм обработать вазелином. c. Скарифицировать эпидермис на роговом бугорке. d. Деревянным шпателем нанести пасту для обезроживания Dr. Быков на область рогового бугорка, согласно инструкции по применению. 	<ul style="list-style-type: none"> a. В зависимости от возраста телят провести подбор рабочей поверхности сопел термокаутеров «Buddex», «Express», «Portasol II», «Niro» и др. b. Подготовить газовый или электрический обезроживатель для работы. c. Провести контроль степени рабочего состояния обезроживателя. d. Подготовить операционное поле (удаление волосяного покрова и химическая антисептика) для выполнения декорнуации. e. Провести предупреждение роста рогов (с помощью обезроживателя, рабочая поверхность сопла должна разогрета до рабочей температуры) путем воздействия в течение 5–6 секунд, поворачивая насадку по часовой стрелке. Сопло головки термокаутера должно плотно охватывать роговой бугорок и не затрагивать лишние участки кожи. Края сопла должны входить в глубину кожи на 2 – 3 мм и образовывать струп серо-красно-золотистого цвета. f. После прижигания струп и прилегающие участки кожи обработать антисептической аэрозолью.
4. Предоставить покой теленку до восстановления физиологических показателей организма.	
5. По клиническим показаниям проводить обработку антисептической аэрозолью области развития хирургической инфекции.	